

Antitumoralt läkemedel

Abirateron Peroral tablett

ATC-kod: L02BX03

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral
Dosering i förh. måltid:	Tas på fastande mage

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tas minst två timmar efter matintag och ingen mat får ätas under minst en timme efter att tabletterna har tagits.

Preparat med Johannesört ska undvikas. Vid missad dos, ta din vanliga dos nästa dag.

Handhavande:

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i

<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hjärttoxicitet		
Perifera ödem vanligt. Före behandlingsstart bör hjärtsvikt behandlas och hjärtfunktion eventuellt undersökas, efter behandlingsstart uppmärksammas nytillkomna symtom på hjärtsvikt, rytmrubbning och kärlkramp. Kortikosteroid kan minska förekomst och svårighetsgrad.		
Hypertoni	Blodtryck	
Hypertoni vanligt. Kortikosteroid kan minska förekomst och svårighetsgrad.		
Endokrinologi		
Hypokalemi vanligt, kan bli uttalad. Kortikosteroid kan minska förekomst och svårighetsgrad.		
Infektionsrisk		
Urinvägsinfektion vanligt.		
Levertoxicitet		
Förhöjda levervärden vanligt, kan kräva dosminskning, uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS.		
Gastrointestinal påverkan		
Diarré vanligt.		
Interaktionsbenägen substans		
Abirateron metaboliseras via CYP3A4 och därför skall samtidigt intag av kraftiga inducerare av CYP3A4 undvikas (till exempel fenytoin, karbamazepin, rifampicin, rifabutin, rifapentin, fenobarbital, johannesört [Hypericum perforatum]). Se FASS.		
Abirateron påverkar CYP2D6 varför försiktighet ska iakttas med samtidigt intag av läkemedel som aktiveras av eller metaboliseras av CYP2D6. (Till exempel metoprolol, propranolol, desipramin, venlafaxin, haloperidol, risperidon, propafenon, flekainid, kodein, oxykodon och tramadol). Se FASS.		
Abirateron påverkar CYP2C8 varför försiktighet ska iakttas med samtidigt intag av läkemedel som aktiveras av eller metaboliseras av CYP2C8. (Till exempel pioglitazon och repaglinid) Se FASS.		
Försiktighet bör iakttas vid samtidigt intag av läkemedel som har känd risk för QT förlängning eller är kända som arytmibenägna, se FASS.		
Samtidig användning av spironolakton rekommenderas ej, se FASS.		
Samtidig administrering av Ra-223 vid kombinationsbehandling av Abirateron med kortikosteroid är kontraindicerad på grund av ökad frakturrisk och trend till ökad mortalitet. Efterföljande behandling med Ra-223 får tidigast startas 5 dagar efter sista administreringen av kombinationsbehandling av Abirateron med kortikosteroid.		

Fortsättning på nästa sida

Observandum**Kontroll****Stödjande behandling****Övrigt**

Kombinationsbehandling med kortikosteroid under lång tid innebär risk för osteoporos.