

Antitumoralt läkemedel

Aflibercept Intravenös infusion

ATC-kod: L01XX44

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsvikt
Enhet för grunddos:	mg/kg
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsvätska 100 ml Glukos 50 mg/ml 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Koncentrationsintervall: Hållbarhet efter spädning 24 timmar 8 timmar	Förvaring Kallt Rumstemperatur
Spädningsanvisningar Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Administreras via infusionsset med ett 0,2 mikrometer polyetersulfonfilter.		

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet Trombocytopeni med ökad blödningsrisk, i övrigt leukopeni, neutropeni, inklusive febril neutropeni. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		
Hypertoni Hypertoni vanligt, kan bli uttalad.		
Gastrointestinal påverkan Diarré, stomatit, nedsatt aptit, viktnedgång och buksmärta vanligt. Hemorrojder och rektal blödning förekommer. Rapporter finns om gastrointestinal perforation. Risk för fistelbildning är förhöjd (både gastrointestinallyt och icke gastrointestinallyt).		
Levertoxicitet Förhöjda transaminaser vanligt.		
Njurtoxicitet Proteinuri vanligt, kan bli uttalad, nefrotiskt syndrom förekommer, men ovanligt. Förhöjt kreatinin vanligt.		
CNS påverkan Huvudvärk vanligt. Fallrapporter finns om RPLS (Reversible Posterior Encephalopathy Syndrome). Diagnosticera med MR och avbryt behandlingen om verifierad RPLS.		
Hudtoxicitet Hand-fot-syndromet (palmar-plantar erythrodysestesi, PPE) vanligt. Hyperpigmentering. Nedsatt sårhäkning, se FASS.		
Andningsvägar Andfåddhet, heshet vanligt.		
Tromboembolism Rapporter om både arteriell och venös tromboembolism finns, se FASS.		

Fortsättning på nästa sida

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Immunologisk reaktion		
Överkänslighetsreaktioner förekommer.		
Extravasering		
Grön		
Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).		