

Läkemedel

Anastrozol Peroral tablett

ATC-kod: L02BG03

Basfakta

Doseringsaspekter

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beräkningssätt:          | Standarddos                                                 |
| Enhet för grunddos:      | mg                                                          |
| Administreringsväg:      | Peroral                                                     |
| Dosering i förh. måltid: | Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag |

Anvisningar

**Anvisningar för läkemedelsadministration**  
Glömd dos - ta inte dubbel dos (två doser på en gång) för att kompensera för en glömd dos.

**Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**  
Handhavande:  
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner  
ih<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

| Observandum                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kontroll | Stödjande behandling |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>CNS påverkan</b><br>Huvudvärk vanligt. Trötthet/fatigue (asteni) förekommer. Nedstämdhet förekommer. Parestesi och smakförändringar har rapporterats.<br>Karpaltunnelsyndrom beskrivet som ökad risk, dock hos personer med riskfaktorer för karpaltunnelsyndrom i övrigt. |          |                      |
| <b>Gastrointestinal påverkan</b><br>Illamående vanligt. Kräkningar och diarré förekommer.                                                                                                                                                                                     |          |                      |
| <b>Övrigt</b><br>Värmevallningar vanliga.                                                                                                                                                                                                                                     |          |                      |
| <b>Hudtoxicitet</b><br>Hudutslag vanligt. Håravfall förekommer.                                                                                                                                                                                                               |          |                      |
| <b>Övrigt</b><br>Ledvärk och ledstelhet vanligt. Skelettsmärta och muskelvärk förekommer.<br>Minskad nivå på cirkulerande östrogen kan medföra risk för minskad bentäthet. Osteoporos förekommer.                                                                             |          |                      |
| <b>Endokrinologi</b><br>Hyperkolesterolemi förekommer.                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |
| <b>Levertoxicitet</b><br>Förhöjda levervärden förekommer.                                                                                                                                                                                                                     |          |                      |
| <b>Övrigt</b><br>Vaginal torrhet och vaginal blödning förekommer.                                                                                                                                                                                                             |          |                      |
| <b>Interaktionsbenägen substans</b><br>Undvik samtidig administration av Tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar då detta kan minska effekten av anastrozol.                                                                                                        |          |                      |