

Antitumoralt läkemedel

Decitabin Intravenös infusion

ATC-kod: L01BC08

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Glukos 50 mg/ml

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Decitabin 50 mg torrs substans löses med 10 ml Sterilt vatten för injektion, ger lösning med styrkan 5 mg/ml. pH 6,7-7,3.

Ordinerad dos sätts till KALL infusionsvätska inom 15 minuter efter tillsatsen av Sterilt vatten.

Förvaring kallt i upp till 3 timmar kan följas av upp till 1 timme vid rumstemperatur före administrering.

Koncentrationsintervall: 0,15-1,0 mg/ml

Hållbarhet efter spädning

4 timmar (Natriumklorid 9 mg/ml)

4 timmar (Glukos 50 mg/ml)

Förvaring

Kallt

Kallt

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, så följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.		
Infektionsrisk		
Infektionsrisk ökad.		
Gastrointestinal påverkan		
Diarré, kräkningar och illamående vanligt. Enterokolit inklusive neutropen kolit finns rapporterat.		
Slemhinnetoxicitet		
Stomatit vanligt		
CNS påverkan		
Huvudvärk vanligt.		
Övrigt		
Näsblödning vanligt.		
Extravasering		
Grön		
Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).		