

Antitumoralt läkemedel

Epirubicin Intravesikal instillation

ATC-kod: L01DB03

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravesikal

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Lösningen bör kvarhållas i blåsan 1-2 timmar. Eventuellt kan patienten ändra kroppsläge var 15:e min.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

För att förebygga utspädning av den verksamma substansen med urin, bör patienten instrueras att vara sparsam med dryck och peri- och postoperativa infusioner minimeras.

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Injektionsvätska med koncentrationen 2 mg/ml finns tillgänglig. Om lägre koncentration önskas används Natriumklorid 9 mg/ml som spädningsvätska.

Röd lösning.

Hållbarhet efter spädning
72 timmar

Förvaring
Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Cystit Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinerings vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.		
Starkt vävnadsretande Observera att substansen är starkt vävnadsretande.		