

Läkemedel

Filgrastim Subkutan injektion

ATC-kod: L03AA02

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsvikt
Enhet för grunddos:	ME/kg
Administreringsväg:	Subkutan

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Den första dosen får ges tidigast 24 timmar efter avslutad cytostatikaterapi och inom 24 timmar efter benmärgstransfusion.
Doseringsprincip baserat på standarddos och kroppsytta förekommerockså .

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Finns som förfyllda sprutor och som injektionsflaskor.
Styrkan anges som mg/ml, mg eller som miljoner E (ME). Exempel på styrkeangivelse är 300 mikrogram filgrastim (30 miljoner enheter) per 0,5 ml injektionsvätska (0,6 mg/ml).
Handhavande:
Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Andningsvägar Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell pneumoni, har rapporterats efter administrering av G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara större. Debut av pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné i förening med radiologiska fynd såsom lunginfiltrat eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut andningssvikt (ARDS).		
Smärta Muskuloskeletal smärta inklusive ryggsmärta vanlig.		Paracetamol
Övrigt Aortit, rapporter om sällsynta fall. Symtom som feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och förhöjda inflammationsmarkörer. Kapillärläckagesyndrom har rapporterats, utmärks av hypotoni, hypoalbuminemi, ödem och hemokoncentration. Mjältruftur har rapporterats sällsynt. Överväg diagnos om smärta vänster övre kvadrant buk Glomerulonefrit har rapporterats, reversibel vid dossänkning eller utsättning.		