

Läkemedel

Granisetron Intravenös injektion

ATC-kod: A04AA02

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Granisetron ges antingen som långsam intravenös injektion eller som en utspädd intravenös infusion 5 minuter innan behandling med cytostatika påbörjas.

En ml Granisetron kan spädas ut med 5-50 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml för att ges som infusion på 5 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid cirka 9 timmar. Maxdos inom 24 timmar är 9 mg.

1-3 mg långsam iv injektion eller infusion före bemetogen behandling. Vid behandling av illamående kan ytterligare underhållsdoser administreras med minst 10 minuters mellanrum.

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan		
Förstoppning vanligt. Diarré förekommer.		
Övrigt		
Huvudvärk vanligt. Sömnsvårigheter förekommer.		
Hjärttoxicitet		
EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmier eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.		