

Antitumoralt läkemedel

Idelalisib Peroral tablett

ATC-kod: L01EM01

Basfakta

Doseringsaspekter

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beräkningssätt:          | Standarddos                                                 |
| Enhet för grunddos:      | mg                                                          |
| Administreringsväg:      | Peroral                                                     |
| Dosering i förh. måltid: | Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag |

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Missad dos med mindre än 6 timmar - den missade dosen tas snarast möjligt.

Missad dos med mer än 6 timmar - dosen hoppas över och därefter följs det vanliga doseringsschemat.

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Biverkningar

| Observandum                                                                                                                                                                                                                               | Kontroll | Stödjande behandling |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Hematologisk toxicitet</b>                                                                                                                                                                                                             |          |                      |
| Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.                                                                      |          |                      |
| <b>Gastrointestinal påverkan</b>                                                                                                                                                                                                          |          |                      |
| Diarré, illamående, buksmärta, nedsatt aptit och kräkningar. Läkemedelsrelaterad kolit vanligt, allvarliga fall finns. Kan uppstå sent, efter flera månader.                                                                              |          |                      |
| <b>Hudtoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                       |          |                      |
| Utslag vanligt, oftast av mild till måttlig grad. Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens Johnsons syndrom, har rapporterats när Idelalisib givits i kombination med andra antitumorala preparat.                                     |          |                      |
| <b>Levertoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                     |          |                      |
| Transaminas förhöjningar vanligt, kan bli allvarliga, men är enligt uppgift oftast asymptomatiska och reversibla och utan återfall om återstart på lägre dos av preparatet efter ett uppehåll, se FASS.                                   |          |                      |
| <b>Andningsvägar</b>                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |
| Hosta vanligt. Övre luftvägsinfektion förekommer. Lunginflammation. Fallrapporter om pneumonit förekommer, överväg diagnos om allvarlig lunghändelse ej svarar på konventionell antimikrobiell behandling.                                |          |                      |
| <b>Infektionsrisk</b>                                                                                                                                                                                                                     |          |                      |
| Allvarliga infektioner finns rapporterade, inklusive Pneumocystis jiroveci pneumoni, varför profylax mot Pneumocystis jiroveci skall ges till alla patienter under hela behandlingen.                                                     |          |                      |
| <b>Interaktionsbenägen substans</b>                                                                                                                                                                                                       |          |                      |
| Samtidig behandling med CYP3A-substrat med allvarliga biverkningar bör undvikas (Alfuzosin, Amiodaron, Cisaprid, Pimozid, Kinidin, Ergotamin, Dihydroergotamin, Quetiapin, Lovastatin, Simvastatin, Sildenafil, Midazolam och Triazolam). |          |                      |
| Samtidig behandling med CYP3A-inducerare kan ge minskad effekt av Idelalisib och bör därför undvikas (Rifampicin, Fenytoin, Johannesört och Karbamazepin).                                                                                |          |                      |