

Läkemedel

Infliximab Intravenös infusion

ATC-kod: L04AB02

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsvikt
Enhet för grunddos:	mg/kg
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Späd varje ampull 100 mg, med 10 ml sterilt vatten. Snurra försiktigt, skaka ej. Risk för skumbildning. Sätt önskad dos till infusionspåsen.

Använd ett infusionsset inbyggt, sterilt, ickepyrogent filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 1,2 mikrometer eller mindre).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:

Okonjugerad monoklonal antikropp, läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/contentassets/59704405fb4645a7918481e5c9976e7c/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Koncentrationsintervall:

0,4-4 mg/ml

Spädningsanvisningar

Hållbarheten är minst 7 dygn. Data för längre hållbarhet finns angiven för flera olika tillverkare. Se vad som anges för det aktuella preparatet.

Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning

7 dygn (Natriumklorid 9 mg/ml)
7 dygn (Natriumklorid 9 mg/ml)

Förvaring

Kallt
Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Övrigt Biverkningsinformation hämtad från ordinarie användning av Infliximab. Osäkert hur biverkningsprofil ter sig vid off label användning.		
Akut infusionsreaktion/anafylaxi Akut infusionsreaktion finns rapporterat. Fördröjd överkänslighetsreaktioner har också rapporterats, om tidigare TNF alfa-hämmarbehandling givits, se FASS.	Puls Blodtryck	Akutberedskap
Hematologisk toxicitet Anemi, neutropeni, leukopeni och lymfadenopati förekommer. Trombocytopeni, lymfopeni och lymfocytos finns rapporterat.	Blodvärden	

Fortsättning på nästa sida

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Infektionsrisk		
Ökad infektionsrisk. Tuberkulos, invasiv svampinfektion och reaktivering av Hepatit B omnämns, se FASS. Stor osäkerhet vad som stämmer på kortvarig off label behandling.		
Gastrointestinal påverkan		
Buksmärta och illamående vanligt. Förstoppning, diarré, dyspepsi och reflux förekommer. Intestinal obstruktion omnämns. Stor osäkerhet vad som stämmer på kortvarig off label behandling.		
Levertoxicitet	Leverfunktion	
Förhöjda levervärden vanligt. Oftast övergående, oavsett utsättning infliximab eller inte. Enligt FASS vid vanlig användning infliximab: om ALAT värden ≥ 5 gånger normalvärdet och/eller gulsot, ska behandling med infliximab avbrytas och orsak utredas. Fall av gulsot och icke-infektiös hepatit finns rapporterat. Leversvikt finns rapporterat enstaka fall. Stor osäkerhet vad som stämmer på kortvarig off label behandling, uppgift finns att leverförhöjning vanligast efter 2-5 infusioner.		
CNS påverkan	Biverkningskontroll	
Huvudvärk vanligt. Yrsel, parestesi förekommer. Krampanfall och neuropati har rapporterats.		
Ny debut eller förvärrade kliniska symtom av demyeliniserande sjukdom har rapporterats. Enligt uppgift Up to Date (Lexicomp) start av symtom stort spann mellan 1 dos och 14 års behandling.		
Hjärttoxicitet		
Takykardi/hjärtklappning förekommer. Hjärtsvikt har rapporterats. Eventuellt först efter längre tids användning. Stor osäkerhet vad som stämmer på kortvarig off label behandling.		
Hudtoxicitet		
Utslag, klåda, eksem, alopeci och hyperhidros (svettning) förekommer.		
Nyttillkommen eller förvärrad psoriasis förekommer. Stor osäkerhet vad som stämmer på kortvarig off label behandling.		
Övrigt		
Ledvärk, muskelvärk och ryggvärk förekommer.		
Konjunktivit förekommer. Kortvarig synbortfall i nära anslutning till infusion omnämns, se FASS.		
Vid regelbunden användning omnämns ökad cancerrisk, se FASS.		
Extravasering		
Grön		
Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).		