

Antitumoralt läkemedel

Irinotekan Liposomalt Intravenös infusion

ATC-kod: L01CE02

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerat preparat är Onivyde.

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)
<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Glukos 50 mg/ml

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Hållbarhet efter spädning

6 timmar

24 timmar

Förvaring

Rumstemperatur

Kallt

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda genom att vända påsen försiktigt! Hållbarhet enligt FASS.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner. Ökad risk för allvarlig neutropeni inklusive febril neutropeni vid anamnes på tidigare strålbehandling av buken. Eventuellt finns även ökad risk för asiatiska patienter jämfört kaukasiska patienter, se FASS.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Gastrointestinal påverkan Diarré mycket vanlig, kan bli uttalad, förekommer både som tidig och fördröjd variant. Tidig diarré kan var associerad med kolinerga symtom (rinit, salivation, bradykardi, rodnad, mios) och atropin behov. Fördröjd diarré - patient bör vara informerad om vätskeintag, Loperamidbehandling och eventuellt antibiotika behov om diarré fortsätter mer än 48 timmar. Eventuell dosreduktion vid efterföljande behandling, se FASS. I övrigt vanligt med kräkningar, illamående, buksmärta och stomatit.		
CAVE tarmobstruktion Patienter får inte behandlas med liposomalt irinotekan förrän eventuell tarmobstruktion är hävd.		
Akut infusionsreaktion/anafylaxi Akuta infusionsreaktioner förekommer, oftast milda.	Monitorering	Akutberedskap
Interaktionsbenägen substans Bör ej ges samtidigt med potenta CYP3A4 enzyminducerare (som fenytoin, fenobarbital, karbamezepin, rifampicin, rifabutin och johannesört) och utbyte av dessa bör ha skett två veckor före start av liposomalt irinotekan. Bör heller ej ges samtidigt med potenta CYP3A4 emzymhämmare (som grapefruktjuice, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, lopinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telaprevir, vorikonazol) och utbyte av dessa bör ha skett en vecka före start av liposomalt irinotekan. Bör heller ej ges samtidigt med potenta UGT1A-hämmare (som atazanavir, gemfibrozil, indinavir).		

Fortsättning på nästa sida

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hudtoxicitet Alopeci.		
Övrigt Viktminskning, utmattning, asteni, yrsel vanligt. Sömnlöshet relativt vanligt.		