

Läkemedel

Licenspreparat

Klemastin Intravenös injektion

ATC-kod: R06AA04

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Intravenös injektion av TAVEGYL skall utföras mycket långsamt (injektionstid 2-3 minuter. Noggrann kontroll!)

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Innehåller vattenfri etanol.

Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Alternativt kan ampullens innehåll före injektionen spädas med fysiologisk koksaltlösning eller 5%-ig glukoslösning i förhållande 1:5.

Biverkningar

Observandum

Kontroll

Stödjande behandling

CNS påverkan

Trötthet, dåsighet förekommer. Yrsel, huvudvärk finns rapporterat. Paradoxal excitation finns omnämnt som sällsynt, eventuellt större risk hos barn och äldre personer.

Gastrointestinal påverkan

Muntorrhet, illamående, magsmärtor och förstoppning har rapporterats.

Hjärttoxicitet

Monitorering

Takykardi och andra arytmier finns rapporterat. Viss försiktighet vid känd hjärtsjukdom. EKG kontroll. Klemastin injektionslösning skall administreras långsamt.

Interaktionsbenägen substans

Antihistaminer förstärker sederande effekt hos andra substanser med hämmande effekt på CNS. (Exempel på andra substanser med hämmande effekt på CNS är: sömnmedel, antidepressiva, anxiolytikum, opioider och alkohol.)

Klemastin har en viss antikolinerg aktivitet varför effekten hos andra substanser med antikolinerg effekt kan potentieras. (Exempel på andra substanser med antikolinerg effekt är: atropin, tricykliska antidepressiva medel.) Monoaminoxidashämmare (MAOI) ökar och förlänger klemastins antikolinergiska effekt.