

Läkemedel

Medroxiprogesteronacetat Intramuskulär injektion

ATC-kod: G03DA02

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intramuskulär

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Suspensionen omskakas väl och ges djupt intramuskulärt.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk, se rekommenderade instruktioner i<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Övrigt Viktökning och ökad svettning förekommer. Feber ovanligt. Lipodystrofi (förändrad fettfördelning på kroppen, ofta med fettatrofi någonstans) finns angivet som okänd frekvens.		
Endokrinologi Månansikte har rapporterats.		
Övrigt Osteoporos inklusive frakturer till följd av osteoporos finns angivet som okänd frekvens. Minskade östrogennivåer i serum orsakat av Medroxiprogesteronacetatbehandling kan resultera i minskad benmineralhalt hos premenopausala kvinnor och eventuellt öka risken för osteoporos.		
Övrigt Förändrade vaginalblödningar (inklusive oregelbundna blödningar, ökad eller minskad mängd och stänklödning) har rapporterats.		
Övrigt Reaktion på injektionsställe vanligt, smärta eller ömhet vid injektionsställe förekommer. Permanent induration eller atrofi vid injektionsställe och resistens vid injektionsställe angivna som okänd frekvens.		
Tromboembolism Tromboflebit har rapporterats.		
CNS påverkan Tremor förekommer.		
Interaktionsbenägen substans Samtidigt intag av Johannesört vid administrering av Metoxiprogesteronacetat vid kontraception rekommenderas inte, då läkemedelsmetaboliserande enzymer induceras av Johannesört och således kan minska koncentration av Metoxiprogesteronacetat. Vaga uppgifter dock och ej riktat för onkologisk behandling. Starkt enzyminducerande läkemedel som fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, rifampicin, rifabutin och primidon ökar metabolismen av gestagener och samtidig administration skulle således kunna leda till minskad koncentration av Metoxiprogesteronacetat.		