

## Läkemedel

# Mesna Intravenös infusion

ATC-kod: V03AF01

## Basfakta

### Doseringsaspekter

**Beräkningssätt:** Kroppsyta  
**Enhet för grunddos:** mg/m<sup>2</sup>  
**Administreringsväg:** Intravenös

### Anvisningar

#### Anvisningar för läkemedelsadministration

Mesna kan också ges som injektion eller som tabletter.

Mesna skall inte ges i samma dropp som cisplatin/carboplatin eftersom blandningen gulfärgas. Preparaten kan däremot ges i samma kur förutsatt att de ges i separata ingångar eller vid skilda tidpunkter.

#### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Behandling med mesna skall pågå lika länge som behandling med oxazafosforiner plus den tid det tar för metaboliterna att nå icke-

toxiska nivåer. (Ifosfamid och Cyklofosfamid).

#### Handhavande:

Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

### Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

### Spädningsinformation

#### Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

500 ml Plasmalyte

1000 ml Plasmalyte

#### Hållbarhet efter spädning

12 timmar

24 timmar

#### Förvaring

Rumstemperatur

Kallt

#### Spädningsanvisningar

Mesna kan blandas i samma dropp som ifosfamid, se FASS.

### Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödande behandling
<b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b>		Akutberedskap
Fallrapporter om allvarliga allergiska reaktioner.		
<b>Hudtoxicitet</b>		
Hudutslag, klåda vanligt. Allvarliga hudreaktioner finns rapporterade.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Buksmärta, illamående, diarré vanligt. Kräkningar, förstoppning förekommer.		
<b>Övrigt</b>		
Huvudvärk, trötthet, svimningskänsla vanligt.		
Värmevallning vanligt.		
Muskel- och ledvärk förekommer.		