

Antitumoralt läkemedel

Mitomycin Intravesikal instillation

ATC-kod: L01DC03

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravesikal

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Lösningen bör kvarhållas i blåsan 1-2 timmar. Eventuellt kan patienten ändra ställning var 15:e min.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

För undvikande av kontaktdermatit bör patienten uppmanas att tvätta händer och genitalia efter urineringen som följer på läkemedelsadministreringen.

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)
<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Mitomycin injektionsflaska innehållande 40 mg pulver upplöses i 40 ml av medföljande spädningsvätska, ger koncentrationen 1 mg/ml. Efter beredning ska det användas omedelbart, ljuskänsligt, se FASS.

Svagt blå-violett lösning.

Speciell förpackning med instillationsset finns.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Cystit		
Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.		