

## Antitumoralt läkemedel

## Niraparib Peroral kapsel

ATC-kod: L01XK02

## BASFakta

## Doseringsaspekter

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beräkningssätt:          | Standarddos                                                 |
| Enhet för grunddos:      | mg                                                          |
| Administreringsväg:      | Peroral                                                     |
| Dosering i förh. måltid: | Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag |

## Anvisningar

## Anvisningar för läkemedelsadministration

Att ta tabletterna vid sänggående kan vara ett sätt att hantera illamående. Vid missad dos tas nästa dos vid nästa ordinarie doseringstillfälle.

## Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

## Handhavande

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner

i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

## Biverkningar

| Observandum                                                                                                                                                                                                                                  | Kontroll | Stödjande behandling |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Hematologisk toxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                |          |                      |
| Anemi, trombocytopeni och neutropeni mycket vanligt. Se FASS för eventuell dosminskning/uppehåll i behandling. Enstaka fall av MDS/AML Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi) har rapporterats.                                    |          |                      |
| <b>Hypertoni</b>                                                                                                                                                                                                                             |          |                      |
| Hypertoni vanligt. Följ blodtryck och behandla vid behov, eventuell dosreduktion eller uppehåll med Niraparib, se FASS.                                                                                                                      |          |                      |
| <b>Graviditetsvarning</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |
| Ska inte användas under graviditet eller till fertila kvinnor som inte accepterar att använda tillförlitliga preventivmedel under behandlingen och en månad efter sista dos av Niraparib. Graviditetstest ska utföras före behandlingsstart. |          |                      |
| <b>Gastrointestinal påverkan</b>                                                                                                                                                                                                             |          |                      |
| Illamående, förstoppning, kräkningar, buksmärta, diarré, nedsatt aptit och dyspepsia (sura uppstötningar) vanligt. Muntorrhet, uppblåsthet, stomatit förekommer.                                                                             |          |                      |
| <b>Övrigt</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |                      |
| Fatigue, asteni vanligt. Sömnlöshet, ångest och depression förekommer. Huvudvärk, yrsel och smakrubbningar förekommer.                                                                                                                       |          |                      |
| <b>Övrigt</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |                      |
| Ryggsmärta och ledsmärta vanligt. Muskelvärk förekommer.                                                                                                                                                                                     |          |                      |
| <b>Hudtoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                          |          |                      |
| Hudutslag och fotosensitivitet förekommer.                                                                                                                                                                                                   |          |                      |
| <b>Andningsvägar</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |
| Nasofaryngit, andfäddhet och hosta vanligt. Näsblod förekommer.                                                                                                                                                                              |          |                      |
| <b>Infektionsrisk</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |
| Urinvägsinfektion och bronkit förekommer.                                                                                                                                                                                                    |          |                      |
| <b>Hjärttoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |
| Hjärtklappning.                                                                                                                                                                                                                              |          |                      |
| <b>Levertoxicitet</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |                      |
| Förhöjda leverprover vanligt.                                                                                                                                                                                                                |          |                      |