

Läkemedel

Prednisolonnatriumsuccinat Intratekal injektion

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intratekal

Anvisningar

- Anvisningar för läkemedelsadministration**
Ges tillsammans med Cytarabin och Metotrexat som IT-trippel. Vanlig komposition är Cytarabin xx mg, Metotrexat cc mg och Prednisolon-natriumsuccinat vv mg.
- Övriga anvisningar för läkemedelsadministration**
Handhavande:
Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Barn

- Denna basfakta är granskad för barn.
- Barnspecifik kommentar**
För barn kan dosering enligt ålder vara aktuell.
Konsultera alltid respektive protokoll.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar Prednisolon.natriumsuccinat (Precortalon aquosum) 25 mg löses med 1 ml Sterilt vatten. Snurra försiktigt tills lösningen är klar. Stamlösningen är 25 mg/ml.	Hållbarhet efter spädning 12 timmar	Förvaring Kallt
---	---	---------------------------

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Övrigt Biverkningsprofil för denna substans intratekalt är mycket oklar, men givet intratekalt ihop med andra substanser finns det beskrivet smärta vid instickstället och huvudvärk. I kombination med Metotrexat och Cytarabin finns för de substanserna arachnoidit rapporterat.		