

Antitumoralt läkemedel

**Regressionsbasfakta 4-0-0 Liposomalt
Intravenös infusion**

ATC-kod: A11BB22

BASFakta**Doseringsaspekter**

Beräkningssätt:	Adjusted ideal body weight (AIBW)	Maxdos per administrationstillfälle:	10 mg
Enhet för grunddos:	mg/kg	Max ackumulerad dos:	50 mg
Administreringsväg:	Intravenös		
Dosering i förh. måltid:	Tas en halv timme före måltid		

Anvisningar**Anvisningar för läkemedelsadministration**

Anvisningar för läkemedelsadministration

Övriga anvisningar för läkemedelsadministrationÖvriga anvisningar för läkemedelsadministration**Barn**

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

BASFakta används och är granskad för barn

Spädningsinformation**Spädningsvätska**

100 ml Plasmalyte

100 ml Plasmalyte glukos

SpädningsanvisningarAnvisningar med <http://www.google.se>**Hållbarhet efter spädning**
2 timmar (Sterilt vatten)
10 timmar (Sterilt vatten)**Förvaring**
Rumstemperatur
Kallt**Biverkningar**

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Extravasering Röd (Hög koncentration) Testextravasering med hög koncentration	Blodtryck	Hydrering
Extravasering Gul (Låg koncentration) Testextravasering med låg koncentration		