

Antitumoralt läkemedel

**Regressionstestbasfakta 3-10-0 Liposomalt
Intravenös infusion**

ATC-kod: L01XA01

Basfakta**Doseringsaspekter**

Beräkningssätt:	Adjusted ideal body weight (AIBW)	Maxdos per administrationstillfälle:	10 mg/kg
Enhet för grunddos:	mg/kg	Max ackumulerad dos:	50 mg/kg
Administreringsväg:	Intravenös		
Dosering i förh. måltid:	Tas tidigast en timme efter måltid		

Anvisningar**Anvisningar för läkemedelsadministration**

"Anvisningar för läkemedelsadministration"

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration"Övriga anvisningar för läkemedelsadministration"**Barn**

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

"Basfakta används och är granskad för barn"

Spädningsinformation

Spädningsvätska	Koncentrationsintervall:	10 ml
100 ml Plasmalyte		
100 ml Plasmalyte glukos	Hållbarhet efter spädning	Förvaring
	2 timmar (Sterilt vatten)	Rumstemperatur
Spädningsanvisningar	10 timmar (Sterilt vatten)	Kallt
"Anvisningar med http://www.google.com "		

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Extravasering		
Röd (Hög koncentration)	Blodtryck	Hydrering
Testextravasering med hög koncentration		