

Läkemedel

Tamoxifen Peroral tablett

ATC-kod: L02BA01

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral
Dosering i förh. måltid:	Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Dosen tas 1 gång per dag, kan också delas på 2 doseringstillfällen.

Missad dos tas så snart patienten kommer ihåg den. Ta sedan nästa dos vid rätt tidpunkt.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner

i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet		
Anemi, trombocytopeni och leukopeni har rapporterats.		
Övrigt		
Värmevallningar vanliga.		
Övrigt		
Vaginal blödning och vaginala flytningar vanligt. Endometrieförändringar (inklusive hyperplasi och polyper) förekommer. Klåda vulva.		
Ökad incidens av endometriecancer och uterus sarkom har rapporterats hos postmenopausala patienter, se FASS.		
Gastrointestinal påverkan		
Illamående vanligt, oftast övergående. Kräkningar, diarré och förstoppning förekommer.		
Levertoxicitet		
Förhöjda leverprover förekommer. Levercirros och leversvikt har rapporterats.		
Övrigt		
Vätskeretention vanligt (perifera ödem och ödem omnämns).		
Hudtoxicitet		
Hudutslag vanligt. Alopeci/håravfall förekommer. Ovanligare svåra hudproblem har sällsynt rapporterats (erytema multiforme, pemfigusliknande blåsor, Stevens-Johnsons syndrom).		
Tromboembolism		
Tromboemboliska händelser förekommer (inklusive djup ven trombos, mikrovaskulär trombos och pulmonell emboli).		
CNS påverkan		
Sensoriska störningar förekommer (inklusive parestesi (känselförändring) och dysgeusi (smakförändring)). Yrsel och huvudvärk förekommer. Opticusneurit sällsynt.		

Fortsättning på nästa sida

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Interaktionsbenägen substans		
Samtidig administration av Tamoxifen och warfarin kan kräva dosanpassning.		
Samtidig administration av Tamoxifen med cytostatika ger ökad risk för tromboemboliska händelser.		
Samtidig administrering av Tamoxifen och fenytoin kan hämma metabolism av fenytoin enligt en fallrapport, varför rekommendation om att kontrollera plasmakoncentration av fenytoin.		
Samtidig administrering av Tamoxifen och CYP3A4-inducerare förväntas minska plasmakoncentration av Tamoxifen.		
Samtidig administrering av Tamoxifen och CYP3A4-hämmare förväntas öka plasmakoncentration av Tamoxifen.		
Samtidig administrering av Tamoxifen och potenta CYP2D6-hämmare bör undvikas då en möjlig minskad effekt av Tamoxifen ej kan uteslutas. (Exempel på potenta CYP2D6-hämmare är: paroxetin, fluoxetin, kinidin, cinacalcet eller bupropion.)		