

## Antitumoralt läkemedel

## Trametinib Peroral tablett

ATC-kod: L01EE01

## Basfakta

## Doseringsaspekter

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beräkningssätt:          | Standarddos                                           |
| Enhet för grunddos:      | mg                                                    |
| Administreringsväg:      | Peroral                                               |
| Dosering i förh. måltid: | Tas minst en timme före eller två timmar efter måltid |

## Anvisningar

## Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

## Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

## Handhavande

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

## Biverkningar

| Observandum                                                                                                                                                                       | Kontroll | Stödjande behandling |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Hematologisk toxicitet</b>                                                                                                                                                     |          |                      |
| Anemi vanligt. Neutropeni förekommer när Trametinib används i kombination med Dabrafenib. Blödningar, inklusive större blödningar har förekommit.                                 |          |                      |
| <b>Hudtoxicitet</b>                                                                                                                                                               |          |                      |
| Hudbesvär vanligt, förekommer som utslag, klåda, akneiform dermatit, hand-fot syndrom (PPE) och torr hud. Dock oftast milda besvär.                                               |          |                      |
| <b>Hypertoni</b>                                                                                                                                                                  |          |                      |
| Hypertoni vanligt, kan bli uttalad.                                                                                                                                               |          |                      |
| <b>Hjärttoxicitet</b>                                                                                                                                                             |          |                      |
| Vänsterkammardysfunktion och hjärtsvikt förekommer och kan uppstå sent i förloppet. Utgångsvärde på vänsterkammarfunktion bör finnas.                                             |          |                      |
| <b>Gastrointestinal påverkan</b>                                                                                                                                                  |          |                      |
| Diarré, illamående, kräkning, förstoppning, buksmärtor och muntorrhet vanligt.                                                                                                    |          |                      |
| <b>Andningsvägar</b>                                                                                                                                                              |          |                      |
| Interstitiell lungsjukdom och pneumonit i enstaka fall. Kan uppstå sent. Gör uppehåll med behandling och utred vid lungsymtom (andfåddhet, hypoxi, pleuravätska eller infiltrat). |          |                      |
| <b>Ögonpåverkan</b>                                                                                                                                                               |          |                      |
| Dimsyn vanligt. Näthinneavlossning och retinalvensocklusion förekommer, men ovanligt.                                                                                             |          |                      |
| <b>Levertoxicitet</b>                                                                                                                                                             |          |                      |
| Förhöjda levervärden vanligt                                                                                                                                                      |          |                      |