

Antitumoralt läkemedel

Trifluridin, tipiracil (TAS-102) Peroral tablett

ATC-kod: L01BC59

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta	Maxdos per	
Enhet för grunddos:	mg/m ²	administrationstillfälle:	80 mg
Administreringsväg:	Peroral		
Dosering i förh. måltid:	Tas i samband med måltid		

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerad produkt Lonsurf som finns i styrkor 15 mg (trifluridin)/6,14 mg (tipiracilhydroklorid) och 20 mg/8,19 mg.

Doseras 2 gånger dagligen, morgon och kväll.

Tabletterna tas inom 1 timme efter frukost och kvällsmat.

Om doser glöms bort ska patienten inte kompensera för uteblivna doser.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Två olika aktiva substanser ingår - trifluridin och tipiracil.

Trifluridin stoppar cancercellernas tillväxt men metaboliseras lätt vid first-pass-effekt efter oral administrering. Tipiracil förhindrar nedbrytningen av trifluridin och bidrar till att trifluridin verkar under en längre tid.

Handhavande

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk, se rekommenderade instruktioner i <https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Gastrointestinal påverkan Illamående, aptitnedgång, diarré, kräkning och buksmärtor är mycket vanliga till vanliga. Symptomatisk behandling vid behov. Eventuellt dosreduktionsbehov, se FASS.		
Slemhinnetoxicitet Stomatit.		
Njurtoxicitet Proteinuri förekommer. Icke-infektiös cystit och njursvikt ovanligt. Däremot är en sedan tidigare måttligt sänkt njurfunktion associerad med högre grad av biverkningar och dessa patienter bör bevakas noggrant vad det gäller hematologisk toxicitet.		
Övrigt Trötthet vanligt. Feber, sjukdomskänsla, sömnlöshet och ödem relativt vanligt. Känsla av förändrad kroppstemperatur förekommer, liksom allmän försämring och smärta.		
Hudtoxicitet Utslag, håravfall, klåda, torr hud och hand-fot syndrom (PPE) förekommer.		
Övrigt Vid tidigare strålbehandling kan en högre incidens av biverkningar ses.		
Andningsvägar Dyspné och hosta förekommer. Nasofaryngit och rinnsnuva ovanligt. Lungemboli ovanligt.		
CNS påverkan Huvudvärk, svindel och perifer neuropati förekommer.		