

Antitumoralt läkemedel

Licenspreparat

Trofosamid Peroral tablett

ATC-kod: L01AA07

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral

Anvisningar

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat Ixoten Baxter 50 mg finns.

Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet		
Leukopeni förekommer. Anemi och trombocytopeni har rapporterats.		
Dosjustering eller kortvarigt uppehåll av behandlingen vid uttalad leukopeni eller trombocytopeni.		
Gastrointestinal påverkan		
Illamående och kräkning förekommer.		
Eventuellt dosjusteringsbehov, kortvarigt uppehåll i behandlingen alternativt antiemetikabehandling.		
Hudtoxicitet		
Håravfall förekommer.		
Immunologisk reaktion		
Överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Hudreaktioner.		
Övrigt		
Cystit/urinblåsirritation inkluderande blod i urin har rapporterats. Framför allt vid höga doser och högrisk patienter så som tidigare strålbehandling mot bäcken, tidigare cystiter av cyklofosamid, ifosfamid eller trofosamidbehandling eller njurvägsbekymmer i anamnesen.		
CNS påverkan		
Yrsel, trötthet/utmattning finns omnämnt. Neuropati mycket ovanligt.		
Övrigt		
Fallrapporter om sekundära maligniteter och förstadier till maligniteter. Dock ej helt säkerställt orsakssamband.		