

Antitumoralt läkemedel

Vinflunin Intravenös infusion

ATC-kod: L01CA05

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta
Enhet för grunddos:	mg/m ²
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Vinflunin ska ges som 20 minuters intravenös infusion och får INTE ges som snabb intravenös bolus.
Den spädda lösningen ska skyddas från ljus fram till administrering.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Spoldropp med 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml används. Hälften av spoldroppet ska ges före infusionen med vinflunin och hälften efter, se FASS.

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)
<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

Spädningsinformation

Spädningsvätska		Hållbarhet efter spädning	Förvaring
100 ml Glukos 50 mg/ml			
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml			
Spädningsanvisningar		24 timmar	Rumstemperatur
Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda. Ljusskyddas! Hållbarhet enligt FASS.		6 dygn	Kallt

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Gastrointestinal påverkan Förstoppning vanligt, ibland uttalad. Laxativ och dietåtgärder inklusive riklig tillförsel dryck rekommenderas, se FASS.		Hydrering
Hjärttoxicitet Vinfluninbehandlade patienter ska noggrant följas med avseende på hjärtbiverkningar. Det finns fall med ischemiska skador och även enstaka QT-förlängningar.	EKG	
Starkt vävnadsretande Intratekal administrering kan vara fatal.		
Extravasering Röd Vävnadstoxisk, risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Central infart rekommenderas. Räknas som vesicant non DNA binding. Tillhör vinkaalkaloider. Följ instruktionen för värmebehandling, se stöddokument Extravasering. Överväg lokal behandling med Hyaluronidas.		Värme