

Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-1318

BCG intravesikal flerdosinstillation

Diagnoskod: C67

Kurintervall: 7 dagar

Översikt

Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningsätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad	Intravesikal instillation			12,5 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
1. Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad Intravesikal instillation 12,5 mg	x1							

Behandlingsöversikt

En instillation per vecka i 6 veckor med behandlingsstart cirka 4 veckor efter TURB (transuretral resektion), se Vårdprogram, bilaga 5.

Som underhållsbehandling föreslås 1 instillation per vecka i 3 veckor vid 3, 6 och 12 månader.

Anvisningar för regimen

Villkor och kontroller för administration

Stor försiktighet vid katetreringen för att undvika traumatisering. Skadad slemhinna kan ge upphov till systemisk BCG-infektion.

Anvisningar för ordination

Alternativt kan OncoTice användas.

Övrig information

Se basfakta.

Biverkningar

Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad

Observandum

Kontroll

Stödjande behandling

Cystit

Obehag och smärta vid miktion vanlig och övergående. Inflammatorisk reaktion kan utgöra väsentlig del av antitumöraktiviteten.

Immunologisk reaktion

Övergående systemisk BCG-reaktion: låg feber, influensaliknande symtom och allmänt obehag. Avklingar vanligen inom 24-48 timmar.

Paracetamol

Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande för**Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Infektionsrisk**

Allvarlig systemisk BCG-reaktion: feber >39 grader i minst 12 timmar, feber >38,5 grader i minst 49 timmar, se FASS. Kan leda till BCG-sepsis, vilket är en livshotande situation.

Referenser

Oddens et al. Effect of age BCG relative epirubicin

www.regimbiblioteket.se/dokument/Oddens%20Eur%20Urol%202014.pdf

Rentsch et al. BCG strain have an impact on outcome

www.regimbiblioteket.se/dokument/Rentsch%20Eur%20Urol%202014.pdf

Vårdprogram, bilaga 5

www.regimbiblioteket.se/dokument/vp%20urinvar%20aug15.pdf#page=99

Versionsförändringar

Version 1.1

lagt till patientinformationen