

Datum: _____
Läkare: _____
Kur nr: _____
Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____
Yta (m²): _____ Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Lymfom

RegimID: NRB-1107

Cyklofosamid högdos

Ordination/Administrering

| Dag | 1 |
|---|----|
| Cyklofosamidmonohydrat Intravenös infusion 2000 mg/m ² (kroppsyta) | x1 |
| Mesna Intravenös injektion 400 mg/m ² (kroppsyta) | x4 |

Högemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Vikt eller diureskontroll. Kontroll U-Hb dagligen.

Anvisningar för ordination

Prehydrering 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml och posthydrering 3000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Mesna ges vid start av Cyklofosamid och därefter var 4:e timme.

| DAG 1 | Datum _____ | Beställs till kl _____ | Avvakta ja nej | Inf. tid | Klockan | Ssk. sign | Läk. sign |
|-------|--|------------------------|----------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 1. | Tablett/Injektion Antiemetika _____ | | | | | _____ | |
| 2. | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i> | | | | | _____ | |
| 3. | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Intravenös infusion - prehydrering</i> | | | 2 tim. | | _____ | |
| 4. | Cyklofosfamidmonohydrat _____ mg i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim. | | | 1 tim. | | _____ | _____ |
| 5. | Mesna _____ mg Ges intravenöst under 3 min. <i>(Ges strax före eller samtidigt som infusion Cyklofosfamid startas.)</i> | | | 3 min. | | _____ | _____ |
| 6. | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Intravenös infusion - posthydrering</i> | | | 4 tim. | | _____ | |
| 7. | Mesna _____ mg Ges intravenöst under 3 min. <i>(Ges 4 timmar efter avslutad infusion med Cyklofosfamid)</i> | | | 3 min. | | _____ | _____ |
| 8. | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Intravenös infusion - posthydrering</i> | | | 4 tim. | | _____ | |
| 9. | Mesna _____ mg Ges intravenöst under 3 min. <i>(Ges 8 timmar efter avslutad infusion med Cyklofosfamid)</i> | | | 3 min. | | _____ | _____ |
| 10. | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Intravenös infusion - posthydrering</i> | | | 4 tim. | | _____ | |
| 11. | Mesna _____ mg Ges intravenöst under 3 min. <i>(Ges 12 timmar efter avslutad infusion med Cyklofosfamid)</i> | | | 3 min. | | _____ | _____ |