

## Antitumoral regim - Myelom

RegimID: NRB-7735

**Daratumumab underhållsdos, månadsvis**

Diagnoskod: C90

Kurintervall: 28 dagar

## Översikt

## Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningsätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Daratumumab	Subkutan injektion			1800 mg	standarddos		

## Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. Daratumumab Subkutan injektion 1800 mg	x1																					

Dag	22	23	24	25	26	27	28	Ny kur dag 29
1. Daratumumab Subkutan injektion 1800 mg								

Emetogenicitet: Minimal

## Behandlingsöversikt

Daratumumab underhållsdos, månadsvis ges efter kur 9 i Daratumumab-MPV, kur 2-9.

## Anvisningar för regimen

## Villkor för start av regimen

Anmälan till Blodcentralen ska ske när behandling med Daratumumab avslutas.

## Villkor och kontroller för administration

*Daratumumab* subkutan injektion ges i den subkutana vävnaden i buken cirka 7,5 cm till höger eller vänster om naveln under cirka 3-5 minuter. Växla injektionsställen för injektioner som ges efter varandra. Se FASS.

## Anvisningar för ordination

Kontroll av blod- och elektrolytstatus med kreatinin.

Daratumumab premedicinering - om inga reaktioner under kur 1 behövs ingen premedicinering inför följande doser. Om reaktion, se kur 1 eller FASS för premedicinering.

## Dosjustering rekommendation

Daratumumab-dosen bör inte reduceras.

## Biverkningar

**Daratumumab  
Observandum****Akut infusionsreaktion/anafylaxi****Kontroll**Blodtryck  
Puls**Stödjande behandling**

Akutberedskap

Infusionsreaktioner vanligast vid första injektionen, oftast grad 1-2. Upprepad infusionsreaktion förekommer. Premedicineringsbehov för att minska risk. Om grad 4 (anafylaktisk eller livshotande) reaktion avslutas behandlingen.

**Hematologisk toxicitet**

Blodvärden

Enligt lokala riktlinjer

Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Fortsättning på nästa sida

**Daratumumab (Fortsättning)****Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Infektionsrisk**

Infektionsrisk ökad. Övre luftvägsinfektion och lunginflammation vanligast. Herpes Zoster Virus reaktivering förekommer. Hepatit B reaktivering har rapporterats.

**Gastrointestinal påverkan**

Diarré, förstoppning, illamående och kräkningar vanligt.

**Hjärttoxicitet**

EKG

Hypertoni och förmaksflimmer förekommer.

**Andningsvägar**

Hosta och andnöd vanligt.

**Smärta**

Smärtor i rygg, leder och extremiteter förekommer. Även muskulära bröstsmärtor förekommer.

**Övrigt**

Feber och fatigue (utmattning) vanligt. Perifera ödem förekommer.

Erytem eller annan reaktion vid injektionsställe förekommer.

**Övrigt**

Daratumab är en human IgG kappa monoclonal antikropp, detta kan ge inverkan på elfores och bedömning av respons hos vissa patienter med IgG kappa myelom.

**Versionsförändringar****Version 1.3**

Lagt till emetogenicitet Minimal

**Version 1.2**

lagt till patientinformationen

**Version 1.1**

Rättat Daratumab till Daratumumab i rubrik och övrig text.

**Version 1.0**

Regimen fastställdes