

Antitumoral regim - Prostatacancer

RegimID: NRB-9067

Degarelix

Diagnoskod: C61

Översikt

Läkemedel

| Substans | Admini- strering | Spädning | Infusions- tid | Grunddos/ admtillfälle | Beräk- ningssätt | Maxdos/ admtillfälle | Max ack. dos |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Degarelix | Subkutan injektion | | | 240 mg | standarddos | | |
| 2. Degarelix | Subkutan injektion | | | 80 mg | standarddos | | |

Regimbeskrivning

| Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. Degarelix Subkutan injektion 240 mg | x1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Degarelix Subkutan injektion 80 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dag | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. Degarelix Subkutan injektion 240 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Degarelix Subkutan injektion 80 mg | | | | | | | | x1 | | | | | | | | | | | | | |

| Dag | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. Degarelix Subkutan injektion 240 mg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Degarelix Subkutan injektion 80 mg | | | | | | | | | | | | | | | x1 |

Emetogenicitet: Minimal**Behandlingsöversikt**

Startdos med 2X120 mg ges initialt och därefter ges 80 mg månadsvis kontinuerligt. Injicerade lösningen blir en läkemedelsdepå som kontinuerligt frisätter Degarelix.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodtryckskontroll.

Försiktighet vid diabetes pga risk för förändrad glukosintolerans.

EKG för patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning.

Risk för osteoporosrelaterade frakturer. Överväg bentäthetsmätning eller osteoporosbehandling enligt vårdprogram.

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/prostatacancer/vardprogram/omvardnad-rehabilitering-och-behandling-av-biverkningar/#chapter-15-13-Forebyggande-av-skelettkomplikationer>

Villkor och kontroller för administration

Degarelix: Ges som en subkutan injektion i bukområdet. Injektionsstället bör varieras periodiskt. Injektionerna bör ges i områden där patienten inte exponeras för tryck, t ex inte i närheten av byxlinning eller bälte och inte nära revbenen.

Reaktioner från injektionsstället tex smärta och rodnad förekommer. Även influensaliknande symptom förekommer i anslutning till injektion.

Anvisningar för ordination

Regelbunden uppföljning av patienter med anamnes på depression och hypertoni.

Biverkningar

| Degarelix Observandum | Kontroll | Stödjande behandling |
|---|----------|----------------------|
| Övrigt Värmevallningar vanliga. Minskad libido (sexuell lust) och impotens vanligt. Testikelatrofi förekommer. Gynekomasti förekommer. | | |
| Övrigt Sömnbesvär förekommer. Humörförändringar och depression finns rapporterat. | | |
| Hudtoxicitet Reaktioner vid injektionsstället (rodnad, svullnad, smärta) vanligt. Ökad svettning förekommer. Rodnad, klåda, utslag har rapporterats. Alopeci (hårfall) har rapporterats. | | |
| CNS påverkan Yrsel och huvudvärk förekommer. | | |
| Endokrinologi Hyperglykemi och diabetes förekommer. Metabola förändringar som minskad glukostolerans, viktförändringar, förhöjda kolesterolnivåer kan ge ökad risk för kardiovaskulära händelser som angina, hjärtinfarkt, stroke. | | |
| Övrigt Risk för minskad bentäthet, rapporter om osteoporos. | | |
| Hjärttoxicitet Förlängd QT-tid finns beskrivet för androgen deprivationsterapi. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart. | | |

Versionsförändringar

Version 1.4

Ändrat till rätt patientinfo

Version 1.3

Lagt till regimlängd efter decemberändring.

Version 1.2

Patientinfo

Version 1.1

Justerade administrationsschemat.

Version 1.0

Regimen fastställdes