

## Antitumoral regim - bröstcancer

RegimID: NRB-7825

## Exemestan

Diagnoskod: C50

Kurintervall: 28 dagar

## Översikt

## Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningsätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Exemestan	Peroral tablett			25 mg	standarddos		

## Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Exemestan Peroral tablett 25 mg	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1

Dag	22	23	24	25	26	27	28	Ny kur dag 29
1. Exemestan Peroral tablett 25 mg	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	

Emetogenicitet: Minimal

## Behandlingsöversikt

Kontinuerlig behandling.

## Anvisningar för regimen

## Villkor för start av regimen

Östrogenreceptorpositiv invasiv bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

Menopaus ska definieras biokemiskt (luteiniserande hormon [LH], follikelstimulerande hormon [FSH] och/eller östradiolnivåer) hos patienter där menopausstatus är oklar.

Ökad risk för osteoporos. Kontroll av bentäthet vid behov. Behandling av och profylax mot osteoporos startas hos riskpatienter.

## Villkor och kontroller för administration

Tabletterna tas efter en måltid vid ungefär samma tid varje dag.

Undvik samtidigt intag av johannesört, då det kan påverka effekten av Exemestan.

Glömd dos - ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Exemestan Peroral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas inom en halv timme efter måltid

## Anvisningar för ordination

Vid ökad risk för osteoporos, regelbunden kontroll av bentäthet.

## Övrig information

Andelen patienter som fullföljer kontinuerlig antihormonell behandling under 5 år är relativt låg.

Informera patienten att inte avbryta behandlingen på eget initiativ och ha plan för uppföljning under hela behandlingstiden.

## Biverkningar

Exemestan Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b> Leukopeni finns rapporterat.		
<b>Övrigt</b> Värmevallningar vanliga.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Illamående vanligt. Buksmärta, kräkningar, förstoppning och diarré förekommer. Dyspepsi.		
<b>CNS påverkan</b> Huvudvärk vanligt. Sömnbesvär vanligt. Yrsel och parestesi förekommer. Depression förekommer. Trötthet förekommer, somnolens och asteni finns rapporterat. Karpaltunnelsyndrom förekommer.		
<b>Hudtoxicitet</b> Ökad svettning vanligt. Hudutslag, klåda och urtikaria förekommer.		
<b>Övrigt</b> Ledsmärta och muskuloskelettal smärta vanligt. Exemestan sänker östrogen nivåer, vilket kan ge minskad bentäthet och ökad risk för frakturer. Osteoporos förekommer. Överväg kontroll av bentäthet och profylax mot osteoporos.		
<b>Levertoxicitet</b> Förhöjda levervärden finns rapporterat. Hepatit finns rapporterat.		
<b>Interaktionsbenägen substans</b> Samtidig administration med exemestan och kraftig CYP450-inducerare skulle kunna minska effekten hos exemestan. Exempel på kraftiga CYP450-inducerare är rifampicin, fenytoin, karbamazepin och Johannesört ( <i>hypericum perforatum</i> ). Samtidig användning av exemestan och läkemedel som metaboliseras via CYP3A4 och har ett smalt terapeutiskt index skall ske med försiktighet. Samtidig administration med exemestan och östrogeninnehållande läkemedel skall undvikas, då effekten av exemestan skulle komma att motverkas.		

## Referenser

### Half of breast cancer patients discontinue tamoxifen and any endocrine treatment ..

Myrthe P. et al. Half of breast cancer patients discontinue tamoxifen and any endocrine treatment before the end of the recommended treatment period of 5 years: a population-based analysis; Breast Cancer Res Treat (2010) 122:843–851

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20058066/>

### Persistence in patients with breast cancer treated with tamoxifen or aromatase inhibitors..

P. Hadji et.al. Persistence in patients with breast cancer treated with tamoxifen or aromatase inhibitors: a retrospective database analysis; Breast Cancer Res Treat (2013) 138:185–191

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23334803/>

## Versionsförändringar

### Version 1.2

Ändrat filnamn- tagit bort ö, ersatt med o

### Version 1.1

lagt till patientinformation

### Version 1.0

Regimen fastställdes