

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

## Antiemetikaregim

Behandlingsavsikt: Högemetogen

RegimID: NRB-11153

**Förebyggande mot illamående (Steg 7, 4d)**  
(Högemetogen)

## Ordination/Administrering

| Dag                                                                             | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Netupitant, palonosetron<br>(300/0,5)<br>Peroral kapsel<br>300 mg (standarddos) | x1 |    |    | x1 |    |    |    |
| Betametason<br>Peroral tablett<br>8 mg (standarddos)                            | x1 | x1 | x1 | x1 |    |    |    |
| Betametason<br>Peroral tablett<br>4 mg (standarddos)                            |    |    |    |    | x1 |    |    |
| Betametason<br>Peroral tablett<br>2 mg (standarddos)                            |    |    |    |    |    | x1 |    |
| Olanzapin<br>Peroral tablett<br>5 mg (standarddos)                              | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |

**Villkor och kontroller för administration**

Netupitant/Palonosetron: Kapseln tas minst 1 timme före start av antitumoral behandling.

Betametason tabletter löses upp i lite vatten före intag.

Olanzapin tas med fördel till natten. Sederande.

Netupitant, palonosetron (300/0,5) Peroral kapsel

Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

**Anvisningar för ordination**

Netupitant/palonosetron ersätts med: Fosaprepitant 150 mg +Palonosetron 250 µg om det skall ges intravenöst Se FASS.

Netupitant/Palonosetron är ett dubbelverkande antiemetikum som blockerar NK1-receptorer och är samtidigt en långtidsverkande 5-HT3-receptorblockerare. Under behandling och dagarna efter Netupitant/Palonosetron skall man inte ge 5-HT3-receptorblockerare eller NK-1 receptorantagonist. Netupitant/Palonosetron bör kombineras med ett kortisonpreparat. Obs! Dosen betametason > 12mg skall ej överskridas, eftersom nedbrytningen av kortison hämmas av Netupitant/Palonosetron. Ökad risk för förstoppning. Patienten bör ha tillgång till laxerande medel att ta vid behov.

Betapred ges i samma dos om det ges intravenöst.

Olanzapin: Dosering: 5 mg (högst 10 mg) till natten vid behov behandlingsdygn och ett par dagar efter.

**Dosjustering rekommendation**

Om patienten blir mycket påverkad av 5 mg Olanzapin, sänk till 2,5 mg.

Om otillräcklig effekt höj dosen Olanzapin.

Om möjligt avsluta betametason tidigare i de förslag där betametason ges dagarna efter behandling.

Använd illamåendedagbok för utvärdering.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Netupitant, palonosetron (300/0,5) \_\_\_\_\_ mg**  
Ges peroralt  
(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*)

2. **Betametason \_\_\_\_\_ mg**  
Ges peroralt  
(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*  
*Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.*)

3. **Olanzapin \_\_\_\_\_ mg** Kvällsdos  
Ges peroralt

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Betametason \_\_\_\_\_ mg**  
Ges peroralt  
(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*  
*Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.*)

2. **Olanzapin \_\_\_\_\_ mg** Kvällsdos  
Ges peroralt

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Betametason \_\_\_\_\_ mg**  
Ges peroralt  
(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*  
*Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.*)

2. **Olanzapin \_\_\_\_\_ mg** Kvällsdos  
Ges peroralt

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Netupitant, palonosetron (300/0,5) \_\_\_\_\_ mg**  
Ges peroralt  
(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*)

2. **Betametason \_\_\_\_\_ mg**  
Ges peroralt  
(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*  
*Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.*)

3. **Olanzapin \_\_\_\_\_ mg** Kvällsdos  
Ges peroralt

**DAG 5** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Betametason \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Hela dosen löses i lite vatten före intag)*

Morgondos

\_\_\_\_\_

**2. Olanzapin \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 6** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Betametason \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

*(Hela dosen löses i lite vatten före intag)*

Morgondos

\_\_\_\_\_

**2. Olanzapin \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_

**DAG 7** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Olanzapin \_\_\_\_\_ mg**

Ges peroralt

Kvällsdos

\_\_\_\_\_