

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Urinblåse- och  
urinvägscancer

RegimID: NRB-8425

**Gemcitabin-Docetaxel intravesikal flerdosinstillation**

Diagnoskod: C67

Kurintervall: 7 dagar

Ordnation/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
Gemcitabin Intravesikal instillation 1000 mg (standarddos)	x1							
Docetaxel (vattenfri) Intravesikal instillation 37,5 mg (standarddos)	x1							

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Anvisningar för ordination**

Natriumbikarbonat tablett 2 X1 g ordinerar kvällen innan och på morgonen inför behandlingen för att minska irriterande besvär av Gemcitabin (surt pH 2,5).

Patienten informeras om att vara restriktiv med vätska på morgonen före instillation.

Efter blåstömning instilleras först Gemcitabin 1000 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml i blåsan via tappningskateter och kvarhålls där i 90 min.

Blåsan töms, varefter Docetaxel 37,5 mg i 55 ml Natriumklorid 9 mg/ml instilleras via ny tappningskateter. Lösningen kvarhålls i 90-120 min.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. Premedicinering för Gemcitabin<br>(Två tabletter Natriumbikarbonat a´ 1 g intas<br>kvällen före samt på morgonen före instillation.) | _____ | ..... |
| 2. <b>Gemcitabin</b> _____ <b>mg</b><br>Ges intravesikalt   | _____ | _____ |
| 3. <b>Docetaxel (vattenfri)</b> _____ <b>mg</b><br>Ges intravesikalt  | _____ | _____ |