

## Antitumoral regim - Äggstockscancer

RegimID: NRB-2887

## IP Cisplatin (intraperitonealt)

Diagnoskod: C56

## Översikt

## Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningsätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Cisplatin	Intraperitoneal instillation			100 mg	standarddos		

## Regimbeskrivning

Dag	1
1. Cisplatin Intraperitoneal instillation 100 mg	x1

**Emetogenicitet:** Låg**Behandlingsöversikt**

Ges vid ascites. Minst 3 veckor innan behandlingen kan upprepas.

## Anvisningar för regimen

**Villkor för start av regimen**

Kontrollera kreatinin, Om S-kreatinin över normalvärde görs kontroll av njurfunktion med clearancebestämning enligt lokal metod (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearance eller motsvarande). Riktvärde GFR &gt; 60.

**Villkor och kontroller för administration**

Cisplatin späds lämpligen i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

**Anvisningar för ordination**

Ge pre- och posthydrering med 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.

Vid smärta ge NSAID, t.ex Ibuprofen

**Övrig information**

Kan ge övergående buksmärter.

## Biverkningar

**Cisplatin****Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****CAVE aminoglykosider**

Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiella kumulativ nefrototoxicitet.

**Övrigt**

Allergisk reaktion ovanlig vid engångsbehandling intraperitonealt. Kan uppstå vid upprepade behandlingar.

**Hematologisk toxicitet**

Blodvärden

Enligt lokala riktlinjer

Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

**Neuropati**

Neuropati förekommer.

**Gastrointestinal påverkan**

Buksmärta som lokal reaktion. Illamående, kräkningar förekommer. Peritonit omnämns.

Fortsättning på nästa sida

**Cisplatin (Fortsättning)****Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Njurtoxicitet**

Njurfunktion

Hydrering

Njurtoxicitet även vid intraperitoneal instillation. Hydreringsbehov föreligger.

**Interaktionsbenägen substans**

Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.