

Antitumoral regim - Äggstockscancer

RegimID: NRB-2888

IP Mitoxantron (intraperitonealt)

Diagnoskod: C56

Översikt

Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningsätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Mitoxantron	Intraperitoneal instillation			30 mg/m ²	kroppsyta		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Mitoxantron Intraperitoneal instillation 30 mg/m ²	x1

Emetogenicitet: Låg**Behandlingsöversikt**

Ges vid ascites. Minst 3 veckor innan behandlingen kan upprepas.

Anvisningar för regimen

Villkor och kontroller för administration

Mitoxantron späds lämpligen i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination

Vid smärta ge NSAID, t.ex Ibuprofen.

Övrig information

Kan ge övergående buksmärter.

Om laparocentes behov inom en vecka efter behandling bör ascites betraktas som cytostatikaavfall.

Biverkningar

Mitoxantron**Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Gastrointestinal påverkan**

Buksmärta som lokal reaktion förekommer. Bukinfektion/peritonit fåtal fall.

Starkt vävnadsretande