

# Antitumoral regim - Urinblåse- och urinvägscancer

RegimID: NRB-1321

## Mitomycin intravesikal flerdosinstillation

Diagnoskod: C67

Kurintervall: 7 dagar

## Översikt

### Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/admtillfälle	Max ack. dos
1. Mitomycin	Intravesikal instillation			40 mg	standarddos		

### Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
1. Mitomycin Intravesikal instillation 40 mg	x1							

#### Behandlingsöversikt

En instillation per vecka i 6 veckor med behandlingsstart 2-4 veckor efter TURB (transuretral resektion).

### Anvisningar för regimen

#### Övrig information

Se basfakta.

### Biverkningar

#### Mitomycin

##### Observandum

##### Kontroll

##### Stödjande behandling

#### Cystit

Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.

### Versionsförändringar

#### Version 1.1

lagt till patientinformationen