

## Antitumoral regim - Lungcancer

RegimID: NRB-2635

## Mitoxantron intraperikardiellt

## Översikt

## Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/admtillfälle	Max ack. dos
1. Mitoxantron	Intraperikardiell instillation			10 mg	standarddos		

## Regimbeskrivning

Dag	1
1. Mitoxantron Intraperikardiell instillation 10 mg	x1

Emetogenicitet: Låg

## Behandlingsöversikt

Vid malignt perikardexsudat.

## Anvisningar för regimen

## Villkor och kontroller för administration

Mitoxantron 10 mg blandas i 20 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

## Anvisningar för ordination

Kateter läggs in i perikardiet, exsudat tappas ut. Efter instillation av Mitoxantron, spolas katetern med 10 ml isoton Natriumklorid.

Katetern hålls stängd i 1-2 timmar. Därefter tappas vätskan ut och katetern avlägsnas.

Behandlingen kan vid behov upprepas.

## Biverkningar

Mitoxantron  
Observandum

## Kontroll

## Stödande behandling

## Hematologisk toxicitet

Enligt studie har endast enstaka patient fått mild leukopeni.

## Hjärttoxicitet

Enligt studie var exklusionskriterier: verifierad kardiomyopati, icke behandlad hjärtsvikt och uttalad arytm. Således saknas kunskap om eventuella biverkningar hos sådana patienter.

## Gastrointestinal påverkan

Enligt studie enstaka patient upplevt aptitnedgång under några veckor efter instillation.

## Starkt vävnadsretande

## Referenser

Musch E et al. Intrapericardial Instillation of Mitoxantrone in Palliative Therapy of Malignant Pericardial Effusion. Onkologie 2003;26:135-139.

## Versionsförändringar

**Version 1.1**

Lagt till Flödesschema Dag 1