

## Antitumoral regim - Sarkom

RegimID: NRB-8544

**Paklitaxel veckovis**

Diagnoskod: C49

Kurintervall: 7 dagar

## Översikt

## Läkemedel

| Substans      | Admini-<br>strering    | Spädning                                    | Infusions-<br>tid | Grunddos/<br>admtillfälle | Beräk-<br>ningsätt | Maxdos/<br>admtillfälle | Max ack.<br>dos |
|---------------|------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Paklitaxel | Intravenös<br>infusion | 250 ml<br>Natriumklorid 9<br>mg/ml infusion | 60 min.           | 80 mg/m <sup>2</sup>      | kroppsyta          |                         |                 |

## Regimbeskrivning

| Dag  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ny kur dag<br>8 |
|--|----|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| 1. Paklitaxel<br>Intravenös infusion<br>80 mg/m <sup>2</sup> | x1 |   |   |   |   |   |   |                 |

**Emetogenicitet:** Låg**Behandlingsöversikt**

Används vid angiosarkom.

## Anvisningar för regimen

**Villkor för start av regimen**

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus inkl kreatinin.

**Villkor och kontroller för administration**

Ökad beredskap för överkänslighetsreaktion. Överkänslighetsreaktioner är vanliga, särskilt kur 1 och 2. Puls och blodtryck före start. Halvera infusionshastigheten vid tidigare överkänslighetsreaktion (ge på 2 timmar).

Vid administrering ska pvc-fritt inf aggregat med in-line filter med max porstorlek på 0,22 mikrom användas.

**Anvisningar för ordination**

Blodstatus inkl. neutrofila, För behandlingsstart neutrofila &gt;1,5, TPK&gt;100. Kontroll av perifer neuropati.

Paklitaxel - Premedicinering med kortison och antihistaminer, t.ex. peroral behandling med Betametason 8 mg och Desloratadin 10 mg som ges 1-2 timmar före behandlingsstart.

Om tidigare reaktion överväg premedicinering med kortison och antihistamin med start dagen före behandling alternativt avsluta behandlingen.

**Dosjustering rekommendation***Hematologisk toxicitet*

Neutrofila 0,5-1,4 och/eller TPK 75-99 ge 75 % av dosen.

Neutrofila &lt; 0,5 och/eller TPK &lt;75 - behandlingen skjuts upp en vecka.

## Biverkningar

| <b>Paklitaxel<br/>Observandum</b>  | <b>Kontroll</b>     | <b>Stödjande behandling</b>                                      |
|--|---------------------|--|
| <b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b>  | Blodtryck<br>Puls   | Akutberedskap<br>Kortikosteroid<br>Antihistamin<br>H2 antagonist |
| Premedicinering. Enligt FASS: Kortikosteroid, Antihistamin och H2-antagonist (Histamin-2-receptorantagonist). H2-antagonist har dock tagits bort i regiminstruktionerna, i studier har avsaknad av H2-antagonist ej visat sämre effekt.  |                     |  |
| <b>Hematologisk toxicitet</b>  | Blodvärden          | Enligt lokala riktlinjer   |
| Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.   |                     |  |
| <b>Hudtoxicitet</b>  |                     |  |
| Alopeci mycket vanligt. Nagel och hudförändringar förekommer.  |                     |  |
| <b>Gastrointestinal påverkan</b>   |                     |  |
| Illamående, kräkningar och diarré mycket vanligt. Stomatit vanligt.  |                     |  |
| <b>Neuropati</b>   | Biverkningskontroll |  |
| Neuropati är vanligt, oftast mild, dock kan eventuellt dosjusteringsbehov föreligga, se FASS.  |                     |  |
| <b>Hjärttoxicitet</b>  | EKG                 |  |
| Bradykardi förekommer. Myokardinfarkt och takykardi finns rapporterat. Hjärtsvikt sällsynt.  |                     |  |
| <b>Levertoxicitet</b>  | Leverfunktion       |  |
| Måttlig till svår leverfunktionsnedsättning kan medföra ökad risk för biverkningar, framför allt myelosuppression.   |                     |  |
| <b>Övrigt</b>  |                     |  |
| Ledvärk och muskelsmärta mycket vanligt.   |                     |  |
| <b>Extravasering</b>   |                     | Kyla   |
| <b>Gul</b>   |                     | Hyaluronidas   |
| Klassas som vävnadsretande, men ger sällan allvarlig skada (medelhög risk för vävnadsskada).<br>Följ instruktion för kylbehandling, se extravaseringsdokument.<br>Överväg lokal behandling med Hyaluronidas.   |                     |  |
| Traditionellt har kyla varit den specifika åtgärden vid extravasering av taxaner. Det finns nu uppgifter om att värme skulle kunna vara lika bra, med en teoribildning kring att taxaner är icke-DNA bindande (non-DNA binding agents) och därmed liknar vinkaalkaloider. Uppgifterna är dock vaga. Tills bättre fakta kring detta finns föreslås instruktionen för specifik behandling med kyla.  |                     |  |
| <b>Interaktionsbenägen substans</b>  |                     |  |
| Paklitaxel metaboliseras delvis via CYP2C8 och CYP3A4.<br>Avsaknad av läkemedelsinteraktionsstudie.<br>Samtidig administrering av hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel skall medföra försiktighet då risk eventuellt finns för ökad toxicitet genom högre paklitaxel-exponering. (Exempel på hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är ketokonazol och andra imidazol-antimykotika, erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil, klopidogrel, cimetidin, ritonavir, sakvinavir, indinavir och nelfinavir.)<br>Samtidig administrering av inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel rekommenderas inte då risk finns för minskad effekt av Paklitaxel till följd av minskad Paklitaxel exponering. (Exempel på inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är rifampicin, karbamazepin, fenytoin, efavirenz, nevirapin.)<br>Vid administrering i kombination med cisplatin skall Paklitaxel ges före Cisplatin för att undvika risk för ökad myelosuppression som ses om Paklitaxel ges efter Cisplatin, se FASS. |                     |  |

## Biverkningar för regimen

| <b>Observandum</b> | <b>Kontroll</b> | <b>Stödjande behandling</b> |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Håravfall</b>   |                 |                             |

## Referenser

Schlemmer et. al. Paclitaxel in patients with advanced angiosarcomas of soft tissue: a retrospective study of the EORTC soft tissue and bone sarcoma group. Eur J Cancer. 2008 Nov;44(16):2433-6.

Fata et al. Paclitaxel in the treatment of patients with angiosarcoma of the scalp or face. Cancer. 1999 Nov 15;86(10):2034-7.

## Versionsförändringar

**Version 1.2**

Lagt till patientinformationen

**Version 1.1**

Flödesschema- Länkat kommentarerna om BT, puls och premed

**Version 1.0**

Regimen fastställdes