

Datum: _____
 Läkare: _____
 Kur nr: _____
 Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____
 Yta (m²): _____ Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Äggstockscancer

RegimID: NRB-2649

Topotekan iv

Diagnoskod: C56

Kurintervall: 21 dagar

Ordination/Administrering

| Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ny kur dag 22 |
|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|
| Topotekan Intravenös infusion 1,5 mg/m ² (kroppsyta) | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstaus inkl neutrofila och kreatinin. För behandlingsstart neutrofila >1,5, TPK >100 och Hb > 90.

Premedicinering med kortison och antiemetika, t.ex. peroral behandling med Betametason 3 mg eller Ondansetron 8 mg, 30 minuter innan Topotekan.

Dosjustering rekommendation*Hematologisk toxicitet*

NADIR-värde för neutrofila < 1,0 - ge nästa kur med 80 % av dosen.

Om NADIR-värden efter dosreduktion fortsatt är neutrofila < 1,0 - dosreducera ytterligare 10-15 % eller byt regim.

Vid diarré av grad 3 eller 4 ska doserna minskas med 0,4 mg/m²/dygn.

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | |
|--|---------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i> | _____ | |
| 2. Premedicinering för Topotekan <i>(Premedicinering med kortison och antiemetika, t.ex. peroral behandling med Betametason 3 mg och Ondansetron 8 mg, 30 minuter innan Topotekan.)</i> | _____ | |
| 3. Topotekan _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. | 30 min. | _____ |

DAG 2 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|--|---------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i> | | | _____ | |
| 2. Premedicinering för Topotekan <i>(Premedicinering med kortison och antiemetika, t.ex. peroral behandling med Betametason 3 mg och Ondansetron 8 mg, 30 minuter innan Topotekan.)</i> | | | _____ | |
| 3. Topotekan _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. | | 30 min. | _____ | _____ |

DAG 3 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|--|---------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i> | | | _____ | |
| 2. Premedicinering för Topotekan <i>(Premedicinering med kortison och antiemetika, t.ex. peroral behandling med Betametason 3 mg och Ondansetron 8 mg, 30 minuter innan Topotekan.)</i> | | | _____ | |
| 3. Topotekan _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. | | 30 min. | _____ | _____ |

DAG 4 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|--|---------|-------|-------|
| 1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i> | | | _____ | |
| 2. Premedicinering för Topotekan <i>(Premedicinering med kortison och antiemetika, t.ex. peroral behandling med Betametason 3 mg och Ondansetron 8 mg, 30 minuter innan Topotekan.)</i> | | | _____ | |
| 3. Topotekan _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min. | | 30 min. | _____ | _____ |

DAG 5 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|---------|--|-------|-------|
| <p>1. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i></p> | | | _____ | |
| <p>2. Premedicinering för Topotekan <i>(Premedicinering med kortison och antiemetika, t.ex. peroral behandling med Betametason 3 mg och Ondansetron 8 mg, 30 minuter innan Topotekan.)</i></p> | | | _____ | |
| <p>3. Topotekan _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min.</p> | 30 min. | | _____ | _____ |