

Antitumoral regim - Äggstockscancer

RegimID: NRB-2649

Topotekan iv

Diagnoskod: C56

Kurintervall: 21 dagar

Översikt

Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningsätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Topotekan	Intravenös infusion	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion	30 min.	1,5 mg/m ²	kroppsyta		

Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
1. Topotekan Intravenös infusion 1,5 mg/m ²	x1	x1	x1	x1	x1																	

Emetogenicitet: Låg

Anvisningar för regimen**Villkor för start av regimen**

Kontroll av blod-, lever och elektrolytstatus med clearance (Cystatin C, lohexol, kreatininclearance eller motsvarande).

GFR ska vara ≥ 60 ml/min.**Anvisningar för ordination**Kontroll av blodstaus inkl neutrofila och kreatinin. För behandlingsstart neutrofila $>1,5$, TPK >100 och Hb > 90 .

Premedicinering med kortison och antiemetika, t.ex. peroral behandling med Betametason 3 mg eller Ondansetron 8 mg, 30 minuter innan Topotekan.

Dosjustering rekommendation*Hematologisk toxicitet*NADIR-värde för neutrofila $< 1,0$ - ge nästa kur med 80 % av dosen.Om NADIR-värden efter dosreduktion fortsatt är neutrofila $< 1,0$ - dosreducera ytterligare 10-15 % eller byt regim.Vid diarré av grad 3 eller 4 ska doserna minskas med 0,4 mg/m²/dygn.**Biverkningar****Topotekan****Observandum****Hematologisk toxicitet**

Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Gastrointestinal påverkan

Illamående, kräkningar och diarré mkt vanligt, kan bli allvarliga. Symtomatisk behandling av diarré viktigt. Dessutom kan topotekaninducerad neutropeni orsaka neutropen kolit, se FASS.

Andningsvägar

Kan ge interstitiell lungsjukdom (ILD). Underliggande riskfaktorer är tidigare ILD, lungfibros, lungcancer, exponering av torax för strålning, lungtoxiska läkemedel och/eller kolonistimulerande faktorer (tillväxtfaktorer).

Kontroll

Blodvärden

Biverkningskontroll

Monitorering

Stödande behandling

Enligt lokala riktlinjer

Loperamid

Fortsättning på nästa sida

Topotekan (Fortsättning)**Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Extravasering**

Kyla

Gul

Klassas som vävnadsretande, men ger sällan allvarlig skada (medelhög risk för vävnadsskada).

Följ instruktionen för kylbehandling, se stöddokument Extravasering.

Versionsförändringar**Version 1.4**

Justerat information om premedicinering efter byte till lågemetogen regim.

Version 1.3

Ändrat till lågemetogen.

Version 1.2

Tagit bort avsnitt om graviditet under "Allmänna råd"

Version 1.1

lagt till patientinfo