

Datum: _____

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: _____

Kur nr: _____

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Längd (cm): _____

Vikt (kg): _____

Yta (m²): _____

Aktuellt GFR: _____

Antitumoral regim - Bröstcancer

RegimID: NRB-7174

Trastuzumab +Pertuzumab SC (laddningsdos) (Phesgo)

Diagnoskod: C50

Kurintervall: 21 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Pertuzumab, Trastuzumab Subkutan injektion 1200 mg (standarddos)	x1																					

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion. Observation av patienten 30 min efter injektion.

Injektionsstället ska alterneras enbart mellan vänster och höger lår. Nya injektioner ska ges minst 2,5 cm från föregående ställe på frisk hud och aldrig på områden där huden är röd, har blåmärken, är öm eller hård.

Anvisningar för ordination

Regelbunden monitorering av vänsterkammarmfunktion (var 3:e månad adjuvant och 1 ggr/år palliativt).

Dosjustering rekommendation

Phesgo dosreduceras inte. Uppehåll i behandlingen kan behövas vid toxicitet. Se FASS.

(https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplld=20200111000010)

Efter uppehåll mer än 6 veckor, starta med laddningsdos igen.

Antiemetika

Förslag enligt stöddokument:

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter=Antiemetikaregim-1-dag-

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Pertuzumab, Trastuzumab _____ mg**

Ges subkutan

(8 minuters injektion)

2. Observation 30 minuter efter avslutad injektion

.....