

Datum: \_\_\_\_\_  
 Läkare: \_\_\_\_\_  
 Kur nr: \_\_\_\_\_  
 Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
 Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Antitumoral regim - Urinblåse- och  
 urinvägscancer

RegimID: NRB-729

**Vinflunin 280**

Diagnoskod: C65-C68

Kurintervall: 21 dagar

**Ordination/Administrering**

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Vinflunin Intravenös infusion 280 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1																					

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Anvisningar för ordination**

Inför ny kur kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolyter, leverstatus.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
*Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet  
 (Cirka hälften av spoldroppet ges före infusionen med vinflunin och hälften ges efter.)* \_\_\_\_\_
- Tablett/Injektion Antiemetika  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- Vinflunin** \_\_\_\_\_ mg  
 i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml  
 Ges intravenöst under 20 min. 20 min. \_\_\_\_\_